

## MONITORIZACIÓN PACIENTES COVID-19 EN DOMICILIO

- El profesional sanitario establecerá contacto telefónico con la familia 1-2 veces al día, según estado general, preguntando y registrando las respuestas en la tabla adjunta.
- En base a las respuestas obtenidas se decidirá: programar alta, mantener situación, visita domiciliaria o derivación hospitalaria

NOMBRE PACIENTE: \_\_\_\_\_

FECHA CONTROL: \_\_\_\_\_

	9 horas	18 horas
<b>Sueño</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha dormido mal</li> <li>• ha dormido como siempre</li> <li>• somnoliento</li> </ul>		
<b>Alimentación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mal</li> <li>• aceptable</li> <li>• habitual</li> </ul>		
<b>Diuresis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• no orina en 12 horas</li> <li>• orina bien</li> </ul>		
<b>Diarrea</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N<sup>o</sup></li> <li>• consistencia</li> </ul>		
<b>Vómitos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n<sup>o</sup></li> </ul>		
<b>Estado general</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• habitual</li> <li>• irritable</li> <li>• decaído</li> </ul>		

<b>Temperatura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registro</li> </ul>		
<b>Disnea</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiraje supraesternal, supraclavicular</li> <li>• tiraje intercostal</li> <li>• tiraje subcostal</li> </ul>		
FC	En caso de visita domiciliaria	En caso de visita domiciliaria
FR	En caso de visita domiciliaria	En caso de visita domiciliaria
Sat O2	En caso de visita domiciliaria	En caso de visita domiciliaria
<b>Tos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en aumento</li> <li>• en disminución</li> <li>• igual</li> </ul>		
¿Se mantiene en una habitación aislado?		
¿Usa cubiertos y vajilla exclusivamente para él?		
¿Comparte objetos?		
¿Ha recibido visitas?		
¿Algún conviviente presenta síntomas?		

NOTAS: \_\_\_\_\_