

## 2 MESES

Pentavalente (DTPaHibVPI)

+

Hepatitis B



En brazos de la madre, lactando o con gotas dulces

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda. Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas indetectables de glutaraldehído, tiomersal, neomicina, estreptomina y polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a estas sustancias.

Generalmente no tiene efectos secundarios. A veces pueden presentar problemas menores como enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de la inyección o una fiebre leve. Los problemas graves son poco frecuentes y se deben principalmente a reacciones alérgicas a un componente de la vacuna.



## 4 MESES

Pentavalente (DTPaHibVPI)

+


Meningitis C



En brazos de la madre, lactando o con gotas dulces

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda. Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas indetectables de glutaraldehído, tiomersal, neomicina, estreptomina y polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a estas sustancias.

Puede Producir inflamación del área de inyección, algo de fiebre. Puede aparecer en el 5% de los niños menores de año y medio. Irritabilidad, frecuente en niños menores de un año.



## 6 MESES

Pentavalente (DTPaHibVPI)

+


Hepatitis B



En brazos de la madre, lactando o con gotas dulces

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda. Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas indetectables de glutaraldehído, tiomersal, neomicina, estreptomina y polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a estas sustancias.

Generalmente no tiene efectos secundarios. A veces pueden presentar problemas menores como enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de la inyección o una fiebre leve. Los problemas graves son poco frecuentes y se deben principalmente a reacciones alérgicas a un componente de la vacuna.



## 12 MESES

TV (Sarampión, Paperas, Rubeola)

+

Meningitis C



En brazos de la madre, lactando o con gotas dulces

La forma liofilizada es estable, aún bajo cero, y no se daña por congelación. Conservar 2-8°C. Reconstruida deber ser mantenida en frío durante toda la sesión de inmunización ya que pierde rápidamente su potencia inmunogénica. Excipientes: neomicina, albúmina humana. Esta vacuna se obtiene de cultivos en células de embrión de pollo y contiene restos de proteínas de huevo. Ante duda revisad "instrucciones para vacunación triple vírica en personas alérgicas al huevo."

Puede Producir inflamación del área de inyección, algo de fiebre. Puede aparecer en el 5% de los niños menores de año y medio. Irritabilidad, frecuente en niños menores de un año.



## 18 MESES

Pentavalente (DTPaHibVPI)



En brazos de la madre, lactando o con gotas dulces

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda. Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas indetectables de glutaraldehído, tiomersal, neomicina, estreptomina y polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a estas sustancias.



# 3 AÑOS


(Triple vírica)

**Método menos dolor:**  
distracción

**SC brazo**



Izquierdo



La forma liofilizada es estable, no se daña por congelación. Conservar 2-8°C. Reconstruida deber ser mantenida en frío durante toda la sesión de inmunización ya que pierde rápidamente su potencia inmunogénica. Excipientes: neomicina, albúmina humana. Esta vacuna se obtiene de cultivos en células de embrión de pollo y contiene restos de proteínas de huevo. Ante duda revisad "instrucciones para vacunación triple vírica en personas alérgicas al huevo."


# 6 AÑOS

(dTpa)

**Método menos dolor:**  
distracción

**IM deltoides**

Izquierdo




Como en otras vacunas, se debe posponer la administración en niños que padecen enfermedades febriles agudas con temperatura >38°C. Sin embargo, la presencia de una infección leve no es una contraindicación. Bajo ninguna circunstancia debe administrarse vía intravenosa. La dTpa puede causar los siguientes efectos secundarios leves que generalmente sólo duran unos pocos días: fiebre, irritabilidad, dolor en el lugar de la inyección, vómitos, disminución del apetito.

## 12 años(s. escolar)

**varicela(dos dosis)**

**Meningitis C**




**SC en deltoides**

**IM en deltoides**

## 14 años(s. escolar)

**Td adultos**



**IM en deltoides**

## niñas a partir de los 14 años (0-6 meses)

**Papiloma(2 dosis)**



**IM en deltoides**

Es Eficaz pero sólo para los tipos de virus contenidos en la vacuna (16 y 18) y en aquellas niñas vacunadas antes de la edad de inicio de las relaciones sexuales. Es muy poco eficaz en aquellas mujeres que se vacunen después de mantener relaciones sexuales. No es nada eficaz para las infecciones producidas por otros tipos de virus no contenidos en la vacuna.

## Protocolo ante una reacción anafiláctica

EDAD	ADRENALINA SIN DILUIR	ADRENALINA DILUIDA AL 1/10
< 2 años	0'06 ml	0'6 ml
2-5 años	0'12 ml	1'2 ml
6-11 años	0'25 ml	2'5 ml
> 11 años	0'25 - 0'5 ml	5 ml
Adulto	0'5 ml	5 ml

**OXIGENOTERAPIA EN TODOS LOS CASOS**