

La meningitis (y la sepsis) meningocócica es una enfermedad infecciosa muy poco frecuente pero muy grave, que produce secuelas importantes y una mortalidad que ronda el 10 % (fallece 1 de cada 10 afectados).

El meningococo del grupo B es la bacteria que en la actualidad produce más casos de esta enfermedad en España.

Aunque nadie está libre de resultar infectado por el germen, la enfermedad principalmente afecta a niños pequeños y a adolescentes, por lo demás, sanos.

Actualmente se dispone de dos preparados inyectables:

Bexsero®, aplicable desde los 2 meses de edad.

La pauta de vacunación con esta vacuna varía según a la edad de inicio:

Edad	Vacunación 1 ^{ia} N° dosis	Intervalos mínimos entre dosis primarias	Dosis de refuerzo	N° TOTAL de dosis
De 2 a 5 meses	3	1 mes	Sí, 1 dosis a los 12-15 meses de edad	4
De 6 a 11 meses	2	2 meses	Sí, 1 dosis a los 12-23 meses de edad	3
De 12 a 23 meses	2	2 meses	Sí, 1 dosis 12-23 meses después de dosis previa	3
De 2 a 10 años	2	2 meses	No	2
Desde 11 años de edad	2	1 mes	No	2

Esta vacuna causa fiebre con cierta frecuencia, por lo que el fabricante y algunas agencias sanitarias recomiendan, cuando se recibe con otras vacunas, valorar la administración de paracetamol para evitar o aminorar la fiebre.

Trumenba®, aplicable a partir de los 10 años de edad, con pauta de 2 dosis, con 6 meses, al menos, de intervalo entre ellas.

Esta vacunación no está financiada por el Sistema Nacional de Salud, salvo para personas con determinadas inmunodeficiencias y los que hayan padecido anteriormente la enfermedad. En cualquier caso, para adquirir una vacuna frente al meningococo B en la farmacia es preciso presentar receta médica.

El precio de venta al público de cualquiera de las vacunas es de 106,15 € por dosis.