



La **meningitis y la sepsis meningocócicas** son enfermedades infecciosas poco frecuente pero muy graves, que produce secuelas importantes y una mortalidad que ronda el 10 % (fallece 1 de cada 10 afectados).

El **meningococo del grupo B** es la bacteria que en la actualidad produce más casos de estas enfermedades en España.

Aunque nadie está libre de resultar infectado por el germen, la enfermedad principalmente **afecta a niños pequeños y a adolescentes**, por lo demás, sanos.

Se dispone de un único preparado inyectable, de nombre Bexsero®, que podría proteger, en nuestro país, contra la mayoría (75%) de los meningococos B que circulan en nuestro medio.

**La pauta de vacunación varía según a la edad en que esta se inicie:**

| Edad Comienzo Vacunación | N.º dosis Totales | Intervalos entre dosis | Edades de Vacunación  |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---|
| 2 a 5 meses              | 4                 | No menos de 1 mes      | Ejemplo: Si inicia a los 2-3 meses:<br>1ª opción: 2-4-6-12 ó 15 meses<br>2ª Opción: 3-5-7-12 ó 15 meses |
| 6 a 11 meses             | 3                 | No menos de 2 meses    | 1ª y 2ª dosis separadas 2 meses<br>3ª Dosis entre los 12-23 meses                                       |
| 12 a 23 meses            | 3                 | No menos de 2 meses    | 1ª y 2ª dosis entre los 12 y 23 meses<br>3ª dosis 1-2 años tras la 2ª dosis.                            |
| 2 a 10 años              | 2                 | No menos de 2 meses    | 1ª y 2ª dosis separadas al menos 2 meses  |
| > 11 años                | 2                 | No menos de 1 mes      | 1ª y 2ª dosis separadas al menos 2 meses  |

Esta vacuna **causa fiebre con más frecuencia que otras vacunas** y por eso el fabricante y algunas agencias sanitarias recomiendan, cuando se recibe con otras vacunas, **valorar la administración de paracetamol para así evitar o aminorar la posible fiebre, o bien separarla al menos dos semanas.**

La vacunación **no está financiada por el Sistema Nacional de Salud**, salvo para personas con determinadas inmunodeficiencias y los que hayan padecido anteriormente la enfermedad. En cualquier caso, para adquirir la vacuna en la farmacia es preciso presentar una receta médica.

El precio de venta al público de Bexsero® es de 106 € por dosis. Por lo tanto, la vacunación completa de un lactante que inicie la vacunación en el primer semestre de su vida (4 dosis) supondrá 424 € en total.

**Grupo de Enfermedades Infecciosas y Vacunas** de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (APapAndalucía). Descargable en [www.pediatrasandalucia.org/meningoB.pdf](http://www.pediatrasandalucia.org/meningoB.pdf)